

Ann. Mus. Zool. R. Univ. Napoli Vol. 5 1869

— 117 —

DESCRIZIONE DI UNA NUOVA FORMICA ITALIANA

per C. EMERY.

(Il signor Carlo Emery, che con molto zelo si occupa della famiglia de' Formicidei, avendo riconosciuta nella nostra particolare Collezione Entomologica Napoletana una specie nuova, ha gentilmente voluto illustrarla con la descrizione che qui appresso riportiamo).

Bothriomyrmex. n. gen.

♀ Mandibulae trigonae 6-denticulatae; clypeus latus, antice bisinuatus, medio convexus, lateribus depresso, foveam antennalem antice limitans; area frontalis triangularis, latitudine longior; linea frontalis indistincta; laminæ frontales brevissimæ, distantes, vix elevatae, postice obsoletæ in margines foveæ antennalis transeuntes; foveæ antennales magnæ et profundæ, cum foveis clypealibus confluentes, ab insertionibus antennarum ad margines internos oculorum, et a basi clypei ad linæm quæ margines posticos oculorum conjungeret extensæ; antennæ 12-articulatae, longæ et validæ, articulis flagelli, exceptis duobus primis et ultimo, subquadratis vel leviter transversis; petiolus squama erecta superne subtiliore et angustiore.

♂ Mandibulae angustæ, apice oblique emarginatae, acutæ, margine concavo cultrato edentulo; clypeus trapezoideus, convexus; area frontalis distincta; linea frontalis profunde lateque impressa; laminæ frontales brevissimæ, postice convergentes at non confluentes, in margines foveæ antennalis transeuntes; foveæ antennales cum clypealibus confluentes, maximæ, medio approximatae, postice ocellos sere attingentes, antice a clypeo, externe ab oculis limitatae; oculi ad angulos anticos capitis protracti; ocelli valde prominuli, propter fovearum antennalium magnitudinem, in gibbositate verticis positi esse videntur; antennæ 13-articulatae, valde elongatae, scapo brevi, flagelli articulo primo conico, reliquis cylindricis, ultimo compresso incurvo;

squama crassa, supra rotundata parum elevata; genitalia parva, vaginis externis cultriformibus, arcuatis, acuminatis.

Alae anticae ut in genere *Solenopsis*, area discoidali et cubitali una; costae cubitalis ramus externus cum costa transversa conjugitur.

B. Costae. n. sp.

♀. Picco-rufa, subnitida, vix subtilissime microscopice coriacea, mandibulis, antennis, pedibusque dilute flavis, undique subtilissime dense flavidio-pubescentes, sericeo-micans, setulis erectis in abdomine parcis, in clypeo et in thorace vix ullis. Antennarum flagelli articulus primus secundo parum, tertio circiter dimidio longior. Alae anticae corpore longiores, hyalinae, nervis dilute flavis. Long. 2 $\frac{1}{2}$ mm.

♂. Piccus, subnitidus, microscopice coriaceus, parce pubescens, setulis erectis parcis in apice abdominalis, ore, antennis, pedibus genitalibusque pallide flavis. Antennarum scapus articulis flagelli duobus primis vix longior. Alae hyalinae, nervis dilutissimis. Long. 2 mm.

Questa specie è stata scoperta dal Chiarissimo Prof. A. Costa cui son lieto dedicarla, debole segno di stima e di gratitudine. Ne ho veduto due soli individui; una ♀ provviegente dai dintorni di Napoli, ed un ♂ raccolto a Lecce nel Maggio 1866.